

**APROVAÇÃO DE ARTE FINAL - 00**

ÁREA	NOME - VISTO	DATA	APROVADO	
			SIM	NÃO
Controle de Qualidade		___/___/___		
Marketing		___/___/___		
Garantia da Qualidade		___/___/___		
Assuntos Regulatórios		___/___/___		
Responsável Técnico		___/___/___		
Produção		___/___/___		

**BULA PACIENTE ADENON COMPRIMIDOS**

**FORMATO:** 101 x 288 mm

Arquivo: ME4660LH2 BU PAC ADENON CPR.indd

Código atual: ME4660LH2

Código anterior: ME4660L1

Plataforma: Mac - InDesign CS6

Proof nº: 02 - Data: 05.04.2019

Finalização: 05.04.2019

**Nº de Cores:** 1x1 cor

■ Black

**ALTERAÇÕES NA ARTE-FINAL**

- Adequação à RDC 47/2009
- Adequação à RDC 238/2018

**ATENÇÃO:** As cores desta prova são indicativas. A impressão final deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação.

**BOX:** Fonte branca e fundo 50% preto  
Fontes: Times New Roman (corpo 10 pt - entrelinha 11 pt); New Weleda

**WELEDA**  
Desde 1921

**GRF**  
P R O P A G A N D A  
Fone: 11 3765 3466

**Adenon**

Baryta carbonica D3, Berberis vulgaris D3, Calcarea carbonica D10, Mercurius sulphuratus ruber D6

**WELEDA**  
Desde 1921

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**Adenon** - Baryta carbonica, Berberis vulgaris, Calcarea carbonica, Mercurius sulphuratus ruber.

**MEDICAMENTO ANTROPOSÓFICO**

**APRESENTAÇÃO**

Comprimidos de Baryta carbonica D3, Berberis vulgaris D3, Calcarea carbonica D10, Mercurius sulphuratus ruber D6.

Embalagem - Frasco de vidro âmbar com 80 comprimidos.

**USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido contém:

Baryta carbonica D3 trit. .... 46,3 mg  
Berberis vulgaris D3 trit. .... 46,3 mg  
Calcarea carbonica D10 trit. .... 46,3 mg  
Mercurius sulphuratus ruber D6 trit. .... 46,3 mg  
Excipiente\* q.s.p. .... 1 comprimido

\*Lactose, amido e estearato de magnésio vegetal.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

**Adenon** é um medicamento antroposófico indicado no tratamento auxiliar da hipertrofia crônica (aumento do tamanho observado a longo prazo) das amídalas e adenoides, amidalite de repetição, nas infecções agudas, crônicas e frequentes da região do nariz, garganta e amídalas, tendência a resfriar-se facilmente.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**Adenon**, como um medicamento produzido e indicado de acordo com o conhecimento antroposófico, age em primeira linha por meio do estímulo das forças autocurativas do organismo e serve para a harmonização de distúrbios da saúde acima relacionados.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Adenon** é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foi relatada a necessidade de precaução, se administrado conforme a posologia sugerida. As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias não sugeridas por esta bula pode envolver risco e deve estar sob a responsabilidade do prescritor. **Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**Atenção: este medicamento contém LACTOSE.**

**Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Interações medicamentosas: até o momento não houve relatos de interações medicamentosas.**

**Pacientes idosos: não existem advertências ou recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Antes e depois da abertura da embalagem, o produto deve ser armazenado à temperatura ambiente (15 - 30°C), em local seco e protegido da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: televisão, forno de micro-ondas, computador, raios X, aparelho celular, caixa acústica, etc.**

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**APROVAÇÃO DE ARTE FINAL - 00**

ÁREA	NOME - VISTO	DATA	APROVADO	
			SIM	NÃO
Controle de Qualidade		___/___/___		
Marketing		___/___/___		
Garantia da Qualidade		___/___/___		
Assuntos Regulatórios		___/___/___		
Responsável Técnico		___/___/___		
Produção		___/___/___		

**BULA PACIENTE ADENON COMPRIMIDOS**

**FORMATO:** 101 x 288 mm

Arquivo: ME4660LH2 BU PAC ADENON CPR.indd

Código atual: ME4660LH2

Código anterior: ME4660L1

Plataforma: Mac - InDesign CS6

Proof nº: 02 - Data: 05.04.2019

Finalização: 05.04.2019

**Nº de Cores:** 1x1 cor

 Black

**ALTERAÇÕES NA ARTE-FINAL**

- Adequação à RDC 47/2009
- Adequação à RDC 238/2018

**WELEDA**  
Desde 1921

**GRF**  
P R O P A G A N D A  
Fone: 11 3765 3466

**ATENÇÃO:** As cores desta prova são indicativas. A impressão final deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação.

**BOX:** Fonte branca e fundo 50% preto  
Fontes: Times New Roman (corpo 10 pt - entrelinha 11 pt); New Weleda

**Prazo de validade do medicamento: 24 meses**

**Adenon** apresenta-se na forma de um comprimido branco a levemente amarelado, cilíndrico, biconvexo de consistência sólida e textura granular.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Crianças:** nos casos crônicos e como preventivo, recomenda-se tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia durante pelo menos 6 meses. Nos casos agudos, tomar 1 comprimido a cada 2 horas durante pelo menos 3 dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico.

**Adultos:** nos casos crônicos e como preventivo, recomenda-se tomar 2 comprimidos 3 vezes ao dia durante pelo menos 6 meses. Nos casos agudos, tomar 2 comprimidos a cada 2 horas durante pelo menos 3 dias. A posologia poderá ser alterada a critério médico. Tomar os comprimidos com um copo de água. Os comprimidos podem ser mastigados.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 7 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.**

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.**

**Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Caso ocorram, suspenda o uso do medicamento.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Até o momento, não foram relatados ou verificados casos de superdosagem durante o tratamento com o produto. **Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações sobre como proceder.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**Adenon** - 80 comprimidos - MS 1.0061.0007.003-1

Farm. Resp.: Luiz Henrique de Faria e Silva - CRF-SP 23.174

**Fabricado, embalado e distribuído por:**

**WELEDA DO BRASIL - Laboratório e Farmácia Ltda.**

**Rua Brig. Henrique Fontenelle, 33**

**CEP 05125-000 - São Paulo - SP**

**CNPJ 56.992.217/0001-80 - Indústria Brasileira**

**S.A.C. 0800 55 32 66**

**Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 11/02/2019**

