

MODELO DE BULA

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

SORINE SSC

Solução de cloreto de sódio

Solução nasal estéril em frasco de 25 e 50 ml.

USO NASAL

USO PEDIÁTRICO E ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada ml de solução nasal contém:

cloreto de sódio..... 0,9%

Excipiente: água purificada.

VOLUME LÍQUIDO:

Conteúdo: 25 e 50 ml

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

SORINE SSC é uma solução do cloreto de sódio estéril, sem conservantes, que age fluidificando a secreção da mucosa nasal, favorecendo, portanto, a sua eliminação.

SORINE SSC é acondicionado em uma embalagem spray gerando uma maior praticidade, pois sua aplicação em crianças se torna mais rápida e mais conveniente para elas, sem a sensação de estar engolindo líquido pelo nariz.

SORINE SSC apresenta-se em uma embalagem estéril, à prova de contaminações, que permite sua conservação, sem o uso de conservantes. A válvula do frasco do produto possui um filtro microbiológico, que garante a integridade do medicamento.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

SORINE SSC é indicado como fluidificante e descongestionante nasal. Auxilia no tratamento de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por exemplo: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES COM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

SORINE SSC NÃO APRESENTA ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES PARA SEU USO.

NÃO EXISTEM REGISTROS DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS CLINICAMENTE IMPORTANTES.

OS RISCOS DE USO POR VIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO RECOMENDADA, SÃO: A NÃO OBTENÇÃO DO EFEITO DESEJADO E OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS.

ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ DESDE QUE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A AMAMENTAÇÃO.

NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÃO RELATIVA A FAIXAS ETÁRIAS.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

SORINE SSC apresenta-se como um líquido incolor e livre de impurezas visíveis. O medicamento é inodoro.

SORINE SSC é para ser aplicado dentro do nariz. [Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.](#) A posologia é bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente. Utilizar de uma a duas aplicações nasais (“puffs”) em cada narina, várias vezes ao dia, conforme a necessidade.

A quantidade de produto dispensada por spray é de 0,14 ml.

SORINE SSC deve ser utilizado da seguinte maneira:

1. Abra a embalagem e retire o frasco.
2. Retire a tampa protetora do frasco, puxando-a para cima.
3. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e o aplicador entre o dedo indicador e o médio. Antes da primeira aplicação, pressionar a válvula 2 ou 3 vezes até o líquido ser vaporizado.
4. Posicione o frasco em direção da narina e empurre o fundo do frasco, usando o polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme. Evite introduzir o bico do frasco na narina.
5. Repita o mesmo procedimento na outra narina.

Observação: No caso do paciente ser um bebê, mantenha-o levemente inclinado no momento do procedimento.

6. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.

Se necessário, antes de guardá-lo, limpar o bico do frasco com lenço de papel e não lavar com água.

7. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já fluidificadas.

Atenção: a válvula do medicamento não é removível. O medicamento já vem pronto para o uso. Portanto, não se deve perfurar e nem introduzir objetos pontiagudos no aplicador, pois isto irá danificá-lo e irá alterar a dose do medicamento que é liberada, além de permitir uma possível contaminação.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR, OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

NÃO HÁ RELATOS, ATÉ O MOMENTO, DE REAÇÕES ADVERSAS COM O USO TÓPICO (NASAL) DE **SORINE SSC**.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Não há relatos de superdosagem com **SORINE SSC**.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Como todo medicamento, **SORINE SSC** deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

QUAL O PRAZO DE VALIDADE DE SORINE SSC?

O prazo de validade de **SORINE SSC** é de 24 meses a contar da data de sua fabricação, indicada na embalagem do produto.

Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade. NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, PODE PREJUDICAR A SUA SAÚDE.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

SORINE SSC é uma solução isotônica estéril de cloreto de sódio a 0,9%, sem conservantes, que atua na mucosa nasal, fluidificando e diminuindo a viscosidade do muco nasal, facilitando a sua remoção.

A válvula do frasco do produto possui um filtro microbiológico que garante a integridade do medicamento.

SORINE SSC é um descongestionante nasal, que respeita a fisiologia da mucosa, de acordo com a mais moderna orientação pediátrica.

SORINE SSC pode ser utilizado em pacientes adultos e pediátricos como fluidificante das secreções nasais em casos de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

SORINE SSC não contém substâncias vasoconstritoras, portanto, não há risco de ocorrer reações adversas provenientes deste grupo de medicamentos como taquicardia, tremores, etc.

INDICAÇÕES:

Fluidificante e descongestionante nasal.

SORINE SSC está indicado como tratamento coadjuvante para os casos de gripes e resfriados, rinites e de quaisquer outras condições associadas ao ressecamento da mucosa nasal, como nos ambientes fechados (por ex.: salas de aula), baixa umidade do ar e poluição.

CONTRAINDICAÇÕES:

É contraindicado em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade.

SORINE SSC deve ser utilizado da seguinte maneira:

1. Abra a embalagem e retire o frasco.
2. Retire a tampa protetora do frasco, puxando-a para cima.
3. Coloque o frasco sobre o dedo polegar e o aplicador entre o dedo indicador e o médio. Antes da primeira aplicação, pressionar a válvula 2 ou 3 vezes até o líquido ser vaporizado.
4. Posicione o frasco em direção da narina e empurre o fundo do frasco, usando o polegar contra os dedos indicador e médio, de forma rápida e firme. Evite introduzir o bico do frasco na narina.
5. Repita o mesmo procedimento na outra narina.
Observação: No caso do paciente ser um bebê, mantenha-o levemente inclinado no momento do procedimento.
6. Tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.
Se necessário, antes de guardá-lo, limpar o bico do frasco com lenço de papel e não lavar com água.
7. Se necessário, assoe o nariz para retirar as secreções já fluidificadas.

Após aberto, conservar o produto conforme descrito no item “Armazenagem”.

O prazo de validade está indicado na embalagem externa do produto.

POSOLOGIA:

SORINE SSC é para ser aplicado dentro das narinas. A posologia é bastante flexível e ampla, já que mesmo irrigações generosas não alteram o movimento ciliar ou são capazes de produzir algum inconveniente. Utilizar de uma a duas aplicações nasais (“puffs”) em cada narina, várias vezes ao dia, conforme a necessidade.

A quantidade de produto dispensada por spray é de 0,14 ml.

ADVERTÊNCIAS:

SORINE SSC NÃO APRESENTA ADVERTÊNCIAS PARA SEU USO. OS RISCOS DE USO POR VIA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO RECOMENDADA, SÃO: A NÃO OBTENÇÃO DO EFEITO DESEJADO E OCORRÊNCIA DE REAÇÕES ADVERSAS.

CATEGORIA DE RISCO DE GRAVIDEZ A: ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ DESDE QUE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO:

SORINE SSC não apresenta advertências para seu uso.
Não há contraindicação relativa a faixas etárias.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Não existem registros de interações medicamentosas clinicamente relevantes.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS:

NÃO HÁ RELATOS, ATÉ O MOMENTO, DE REAÇÕES ADVERSAS COM O USO TÓPICO DE **SORINE SSC**.

SUPERDOSE:

Não há relatos de superdose com **SORINE SSC**.

ARMAZENAGEM:

Como todo medicamento, **SORINE SSC** deve ser guardado em sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Qual o prazo de validade de **SORINE SSC**?

O prazo de validade de **SORINE SSC** é de 24 meses a contar da data de sua fabricação, indicada na embalagem do produto.

[MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC nº 199/2006. AFE nº 1.00.573-9.](#)

Farmacêutico Responsável: Wilson R. Farias CRF-SP nº. 9555

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP
CNPJ 60.659.463/0001-91 - Indústria Brasileira



Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**