

## APRESENTAÇÕES

### Comprimido 25mg+250mg

Embalagens contendo 30 e 50 comprimidos.

## USO ORAL

### USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

carbidopa monoidratada (equivalente a 25mg de carbidopa)  
levodopa.....

Excipiente q.s.p.....

Excipientes: celulose microcristalina, álcool etílico, p  
corante azul indigotina laca.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento da doença de Parkinson.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Os sintomas da Doença de Parkinson são decorrentes de uma deficiência de dopamina no sistema nervoso central (SNC). A dopamina é uma substância produzida pelas células do SNC. O tratamento da doença se baseia na reposição da dopamina. A administração deste medicamento, que é a associação de carbidopa e levodopa, é convertida posteriormente em dopamina, e a carbidopa libera a levodopa, liberando assim mais levodopa para sua posterior conversão em dopamina.

Assim, ao tomar esta medicação, administra-se um medicamento que se transforma em dopamina no cérebro, melhorando os sintomas da doença. Este mecanismo é responsável pela sintomatologia da doença.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O Carbidol® é contraindicado para pacientes com glaucoma, doença de melanoma ou sem diagnóstico.

contraindicada para pacientes portadores de glaucoma, doença de melanoma ou sem diagnóstico.

Não se deve usar simultaneamente medicações inibidoras da MAO-B com o Carbidol® (exceto inibidores da MAO-B em doses baixas). Se necessário, interromper pelo menos duas semanas antes de iniciar o uso deste medicamento.

**Este medicamento é contraindicado para uso por gestantes e lactantes.**