

Moduretic<sup>®</sup>  
hidroclorotiazida/cloridrato de amilorida

Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.

Comprimidos

50 mg/ 5 mg  
25 mg/ 2,5 mg

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

---

### **MODURETIC®** **hidroclorotiazida/cloridrato de amilorida**

#### **APRESENTAÇÕES**

MODURETIC® comprimidos de:

-50 mg de hidroclorotiazida e 5 mg de cloridrato de amilorida em embalagem com 30 comprimidos.

-25 mg de hidroclorotiazida e 2,5 mg de cloridrato de amilorida em embalagem com 30 comprimidos.

#### **USO ORAL**

#### **USO ADULTO**

#### **COMPOSIÇÃO**

MODURETIC® 50/5 comprimido:

hidroclorotiazida..... 50 mg

cloridrato de amilorida.....5,68 mg (equivalente a 5 mg de amilorida)

MODURETIC® 25/2,5 comprimido:

hidroclorotiazida..... 25 mg

cloridrato de amilorida.....2,84 mg (equivalente a 2,5 mg de amilorida)

Excipientes: lactose monohidratada, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, amido, amido pré-gelatinizado, goma guar e estearato de magnésio. Os comprimidos de MODURETIC® 50/5 contém, ainda, corante amarelo FD&C nº 6 laca alumínio.

#### **INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

---

##### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

O seu médico prescreveu MODURETIC® para ajudar a manter níveis normais de potássio em seu sangue. MODURETIC® é indicado para o tratamento da hipertensão (pressão alta), edema (inchaço dos tornozelos, pés e pernas causados pela retenção de água) ou ascite (acúmulo de água no abdômen) decorrente de cirrose (doença hepática).

##### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O ingrediente amilorida de MODURETIC® é um medicamento do grupo de fármacos denominado poupadores de potássio; a amilorida também é um fraco diurético. O ingrediente hidroclorotiazida de MODURETIC® é um medicamento do grupo de fármacos denominado diuréticos.

MODURETIC® age fazendo com que seus rins permitam a passagem de mais água e sal e retenham mais potássio. Essa ação ajuda a reduzir a pressão alta e algumas formas de inchaço, ao mesmo tempo em que ajuda a manter os níveis normais de potássio no sangue.

##### **Informações ao paciente com pressão alta**

###### **O que é pressão arterial?**

É a pressão gerada pelo seu coração ao bombear o sangue para todas as partes do corpo; sem a pressão arterial, o sangue não circula pelo corpo. Uma pressão arterial normal é essencial para uma boa saúde.

A pressão arterial sofre alterações durante o dia, dependendo da atividade, do estresse e da excitação a que as pessoas estão expostas. A leitura da pressão arterial é composta de dois números, por exemplo, 120/80 (lê-se: cento e vinte por oitenta). O número mais alto representa a força medida enquanto seu coração está bombeando sangue e o número mais baixo representa a força medida em repouso, entre os batimentos cardíacos.

###### **O que é pressão alta (ou hipertensão)?**

Uma pessoa tem pressão alta ou hipertensão quando sua pressão arterial é alta mesmo quando se está calmo(a) e relaxado(a). Observa-se pressão alta quando os vasos sanguíneos se estreitam e dificultam o fluxo do sangue pelo corpo. A causa exata da pressão alta é desconhecida.

### **Como saber se tenho pressão alta?**

Em geral, a pressão alta não causa sintomas. A única maneira de saber se você tem hipertensão é medindo sua pressão arterial; por isso, você deve medir sua pressão arterial regularmente.

### **Por que a pressão alta (ou hipertensão) deve ser tratada?**

Se não for tratada, a pressão alta pode causar danos a órgãos essenciais para a vida, tais como o coração e os rins. Você pode estar se sentindo bem e não apresentar sintomas, mas a hipertensão pode causar derrame (acidente vascular cerebral), ataque cardíaco (infarto do miocárdio), insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou perda da visão. A pressão alta pode ser tratada e controlada com medicamentos como MODURETIC®.

Seu médico pode lhe dizer qual a pressão arterial ideal para você. Memorize o valor estipulado por ele e siga as recomendações para atingir a pressão arterial ideal para você.

## **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você **não** deve tomar MODURETIC® se:

- for alérgico a qualquer um de seus ingredientes (veja o item **COMPOSIÇÃO**);
- for alérgico a qualquer derivado da sulfonamida (pergunte ao seu médico se não tiver certeza de quais fármacos são derivados da sulfonamida);
- já apresentar naturalmente níveis elevados de potássio no sangue;
- estiver tomando outros fármacos ou suplementos para aumentar a quantidade de potássio no sangue;
- apresentar doença renal.

Entre em contato com seu médico se não tiver certeza se deve iniciar o tratamento com MODURETIC®.

## **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Informe ao seu médico sobre quaisquer problemas médicos e alergias que apresente ou tenha apresentado.

Informe ao seu médico se apresenta níveis elevados de potássio no sangue naturalmente, doença cardíaca ou pulmonar, problemas hepáticos ou renais, gota e lúpus eritematoso, ou se está sendo tratado com outros diuréticos. Nesses casos, seu médico pode ter de ajustar a dose de seus medicamentos. Além disso, você deve notificar seu médico caso sofra de diabetes, pois o uso de tiazidas pode tornar necessário o ajuste de dose dos medicamentos antidiabéticos, incluindo a insulina.

Antes de cirurgias ou anestésias (mesmo no consultório odontológico), diga ao médico ou ao dentista que está tomando MODURETIC®, pois pode ocorrer queda repentina da pressão arterial associada à anestesia.

Informe ao seu médico se você já teve câncer de pele ou se você desenvolver alguma nova lesão de pele durante o tratamento. O tratamento com hidroclorotiazida, particularmente com altas doses à longo prazo, pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer de pele e lábio (câncer de pele não melanoma). Converse com seu médico como proteger sua pele da exposição solar e evite bronzeamento artificial.

**Gravidez e Amamentação:** o uso de MODURETIC® não é recomendado para mulheres grávidas. Se estiver grávida ou pretende engravidar, informe ao seu médico antes de iniciar o tratamento com MODURETIC® pois outro tratamento pode ser considerado.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista.**

O componente hidroclorotiazida de MODURETIC® aparece no leite materno. Se estiver amamentando ou pretender amamentar, consulte seu médico.

**Crianças:** ainda não foram estabelecidas a segurança e a eficácia em crianças.

**Dirigir ou Operar Máquinas:** quase todos os pacientes podem realizar essas tarefas. No entanto, atividades que possam exigir atenção especial (por exemplo, conduzir veículos ou operar máquinas perigosas) devem ser evitadas até que se conheça qual sua tolerância a esse medicamento.

**Este medicamento pode causar doping.**

**Interações Medicamentosas:** em geral, MODURETIC® pode ser tomado com outros medicamentos. No entanto, é importante informar ao seu médico sobre outros medicamentos que você esteja tomando, incluindo aqueles obtidos sem prescrição, já que alguns medicamentos podem afetar a ação de outros. É especialmente importante informar ao seu médico se você está tomando algum inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA), um antagonista receptor da angiotensina II, outros medicamentos poupadores de potássio ou suplementos de potássio. Informe também ao seu médico se está tomando outros medicamentos para reduzir a pressão arterial, outros diuréticos, resinas que reduzem o colesterol alto, medicamentos para tratar diabetes (inclusive insulina), relaxantes musculares, aminas vasoativas (como adrenalina), esteroides, analgésicos e antiartríticos, ciclosporina, tacrolimo ou lítio (substância usada para tratar um certo tipo de depressão). Sedativos, tranquilizantes, narcóticos, álcool e analgésicos podem aumentar o efeito hipotensor de MODURETIC®.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

### **Aparência**

MODURETIC® 50 mg/5 mg: comprimidos em forma de diamante, cor de pêssego, sulcado em um lado, plano de outro lado e com a inscrição “917” em ambos os lados do sulco.

MODURETIC® 25 mg/2,5 mg: comprimidos em forma arredondada, cor quase branca, um lado é sulcado e o outro é plano.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Seu médico irá decidir qual a dose adequada, dependendo de sua condição e se está ou não tomando outros medicamentos. A maioria das pessoas toma MODURETIC® com um pouco de água.

Tome MODURETIC® diariamente, exatamente conforme a orientação de seu médico. É muito importante manter o tratamento com MODURETIC® pelo tempo prescrito por seu médico e não tomar mais comprimidos do que a dose prescrita.

MODURETIC® está disponível para uso oral em forma de comprimidos, em duas concentrações (veja o item **APRESENTAÇÕES**).

**Hipertensão:** a posologia usual é de 1 comprimido de MODURETIC® 50 mg/5 mg (equivalente a 2 comprimidos de MODURETIC® 25 mg/2,5 mg), uma vez ao dia ou em doses fracionadas.

**Edema de origem cardíaca:** a dose inicial usual é de 1 comprimido de MODURETIC® 50 mg/5 mg (equivalente a 2 comprimidos de MODURETIC® 25 mg/2,5 mg) ao dia.

**Cirrose hepática com ascite:** a dose inicial usual é de 1 comprimido de MODURETIC® 50 mg/5 mg (equivalente a 2 comprimidos de MODURETIC® 25 mg/2,5 mg), uma vez ao dia.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Deve-se tomar MODURETIC® conforme a prescrição. Se você deixou de tomar uma dose, deverá tomar a dose seguinte como de costume; isto é, na hora regular e sem duplicar a dose.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Qualquer medicamento pode apresentar efeitos adversos ou indesejáveis, denominados efeitos colaterais. MODURETIC® em geral é bem tolerado. Os efeitos adversos comuns (entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento) incluem cefaleia, fraqueza, náusea/falta ou perda de apetite, erupção cutânea ou tontura. Podem ocorrer outros efeitos adversos e alguns deles podem ser graves.

A hidroclorotiazida, componente deste medicamento, aumenta a sensibilidade da pele ao sol e pode aumentar o risco de alguns tipos de câncer de pele e lábios (câncer de pele não melanoma).

Solicite ao seu médico mais informações sobre efeitos adversos; ele possui uma lista mais completa das reações que podem ocorrer.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de superdose, avise seu médico imediatamente para que ele possa agir imediatamente. Os sintomas mais prováveis são sensação de delírio ou tontura decorrentes da queda da pressão arterial, sede excessiva, confusão, alteração da quantidade de urina e/ou aceleração da frequência cardíaca.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## DIZERES LEGAIS

---

MS 1.0029.0137

Farm. Resp.: Fernando C. Lemos - CRF-SP nº 16.243

Registrado por:

Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.

Rua 13 de Maio, 815 - Sousas, Campinas/SP

CNPJ: 45.987.013/0001-34 - Indústria Brasileira

SAC 0800-708-1818

supera.atende@superarx.com.br



Fabricado por:

Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.

Rua 13 de Maio, 1.161 - Sousas, Campinas/SP

Comercializado por:

Supera RX Medicamentos Ltda. – Pouso Alegre/MG

MODURETIC\_BU07\_022019\_VP

Venda sob prescrição médica



### Histórico de alteração para a bula

| Dados da submissão eletrônica |                      |                                                                                     | Dados da petição/notificação que altera a bula |                      |         |                   | Dados das alterações de bulas                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do expediente            | Número do expediente | Assunto                                                                             | Data do expediente                             | Número do expediente | Assunto | Data de aprovação | Itens de bula                                                                                                                                                                         | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                                                               |
| -                             | -                    | 10451 - MEDICAMENTO NOVO –<br>Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | N/A                                            | N/A                  | N/A     | N/A               | - DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                                      | VP               | 25 MG + 2,5 MG<br>COM CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br><br>50 MG + 5 MG COM<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 12/02/2019                    | 0129249/19-8         | 10451 - MEDICAMENTO NOVO –<br>Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | N/A                                            | N/A                  | N/A     | N/A               | - DIZERES LEGAIS                                                                                                                                                                      | VP               | 25 MG + 2,5 MG<br>COM CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br><br>50 MG + 5 MG COM<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 28/01/2019                    | 0081269/19-2         | 10451 - MEDICAMENTO NOVO –<br>Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | N/A                                            | N/A                  | N/A     | N/A               | - COMPOSIÇÃO;<br>- 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?;<br>- 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?.                                                  | VP               | 25 MG + 2,5 MG<br>COM CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br><br>50 MG + 5 MG COM<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 22/05/2017                    | 0962497/17-0         | 10451 - MEDICAMENTO NOVO –<br>Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | N/A                                            | N/A                  | N/A     | N/A               | - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO;<br>- 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?;<br>- 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESSE MEDICAMENTO?;<br>- DIZERES LEGAIS. | VP               | 25 MG + 2,5 MG<br>COM CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br><br>50 MG + 5 MG COM<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |

|            |              |                                                                                        |     |     |     |     |                                                                                                                    |    |                                                                                                          |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2013 | 0505107/13-0 | 10451 - MEDICAMENTO NOVO –<br>Notificação de Alteração de Texto<br>de Bula – RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | DIZERES LEGAIS                                                                                                     | VP | 25 MG + 2,5 MG<br>COM CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br><br>50 MG + 5 MG COM<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 16/05/2013 | 0389168/13-2 | 10451 - MEDICAMENTO NOVO –<br>Notificação de Alteração de Texto<br>de Bula – RDC 60/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | DIZERES LEGAIS                                                                                                     | VP | 25 MG + 2,5 MG<br>COM CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br><br>50 MG + 5 MG COM<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |
| 14/05/2013 | 0379263/13-3 | 10458 - MEDICAMENTO NOVO -<br>Inclusão Inicial de Texto de Bula –<br>RDC 60/12         | N/A | N/A | N/A | N/A | ADEQUAÇÃO À RDC<br>47/2009<br>- APRESENTAÇÕES<br>- COMPOSIÇÃO<br>- 3. QUANDO NÃO DEVO<br>USAR ESTE<br>MEDICAMENTO? | VP | 25 MG + 2,5 MG<br>COM CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30<br><br>50 MG + 5 MG COM<br>CT BL AL PLAS<br>TRANS X 30 |